

自覚症状のない赤い皮疹が手足に出ています 梅毒感染の可能性も。気になる人は血液検査を 中野皮膚科クリニック

<http://www.nakano-derma.com/>



梅毒2期に現れる斑状の皮疹。痛みやかゆみはない

「梅毒2期に現れる斑状の皮疹。痛みやかゆみはない」
 梅毒2期に現れる斑状の皮疹。痛みやかゆみはない。この時期には、全身に広がり、体幹部や手のひら、足裏などに赤い斑点のような皮疹が現れることがあります。一治療は？
 「梅毒による皮疹は、かゆみや痛みといった自覚症状がないのが特徴ですが、血液検査で診断が可能です。治療はペニシリンの内服を一定の期間続けることとなります。パートナーから感染した女性は梅毒の可能性に気が付かないこともあると思いますが、そのまま妊娠すると胎児に影響を与えます。気になる症状があれば早めに受診し、治療はパートナーと一緒にすることを勧めます。また、梅毒にかかると粘膜に傷がつき、HIVにも感染しやすくなるので注意が必要です」

皮膚に多彩な皮疹が現れることによって気がつくことが多い梅毒。その症状と治療法について、日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・中野皮膚科クリニックの松尾光馬院長に聞きました。
 「どのような病気でですか？」
 「梅毒トレポネーマによっておきる感染症で、おもに性行為によって感染（かいよう）ができます。染します。母子感染によ

「感染時期によって症状が変化します。感染3週から3カ月で生じる1期疹では、感染部位の皮膚が腫れや潰瘍（かいよう）ができます。放っておくと消えます」
 「梅毒による皮疹は、かゆみや痛みといった自覚症状がないのが特徴ですが、血液検査で診断が可能です。治療はペニシリンの内服を一定の期間続けることとなります。パートナーから感染した女性は梅毒の可能性に気が付かないこともあると思いますが、そのまま妊娠すると胎児に影響を与えます。気になる症状があれば早めに受診し、治療はパートナーと一緒にすることを勧めます。また、梅毒にかかると粘膜に傷がつき、HIVにも感染しやすくなるので注意が必要です」

中野皮膚科クリニック
(マルニビル5階)



問い合わせ
中野皮膚科クリニック
中野区中野2-30-3、マルニビル5階。中野駅南口徒歩2分
☎03-5342-0722

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:30 ~ 13:00	○	○	○	○	○	○
15:00 ~ 18:30	○	○	○	○	○	—

休診日:日曜、祝日

院長:松尾光馬 日本皮膚科学会皮膚科専門医、医学博士。東京慈恵会医科大学医学部卒業、同大附属病院皮膚科非常勤講師