

おなかに赤い斑点が広がっています
ジベルばら色秕糠疹(ひこうしん)かもしれません

中野皮膚科クリニック
http://www.nakano-derma.com/

背中にはタクリスマスツリー状に淡い赤色の斑点が広がる



最初にやや
大きめの赤い
発疹ができる

「最初に胸などにポツポツと赤い発疹ができるの10代〜40代の女性に多いです。斜めに発疹ができます。マツリーを描くように。」

「かゆみがあるときは抗アレルギー剤を服用し、発疹はステロイドの外用や紫外線(UVB)の照射による治療を行います。診断は経過や発疹の分布などの見た目だけでなく、生検を行うことで、よりはっきり診断することができます。多くは1、2カ月の経過で自然に治りますが、治りが遅い場合、他の病気による発疹のことがあるため、皮膚科を受診することをおすすめします。」

突然、全身に赤色の発疹(ほっしん)が広がる「ジベルばら色秕糠疹(ひこうしん)」について、日本皮膚科学会皮膚科専門医で中野皮膚科クリニック院長の松尾光馬先生に聞きました。

「どつという症状の病気で、最初に胸などにポツポツと赤い発疹ができるの10代〜40代の女性に多いです。斜めに発疹ができます。マツリーを描くように。」

「かゆみがあるときは抗アレルギー剤を服用し、発疹はステロイドの外用や紫外線(UVB)の照射による治療を行います。診断は経過や発疹の分布などの見た目だけでなく、生検を行うことで、よりはっきり診断することができます。多くは1、2カ月の経過で自然に治りますが、治りが遅い場合、他の病気による発疹のことがあるため、皮膚科を受診することをおすすめします。」


「原因は?」

「ウイルスや薬剤など、多様な要因が影響していると考えられています。が、はっきりした原因は分かっています。」

「治療法は?」

「かゆみがあるときは抗アレルギー剤を服用し、発疹はステロイドの外用や紫外線(UVB)の照射による治療を行います。診断は経過や発疹の分布などの見た目だけでなく、生検を行うことで、よりはっきり診断することができます。多くは1、2カ月の経過で自然に治りますが、治りが遅い場合、他の病気による発疹のことがあるため、皮膚科を受診することをおすすめします。」

問い合わせ
中野皮膚科クリニック
中野区中野2-30-3、マルニビル5階。中野駅南口徒歩2分
☎03-5342-0722



診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:30 ~ 13:00	○	○	○	○	○	○
15:00 ~ 18:30	○	○	○	○	○	—

休診日:日曜、祝日

院長:松尾光馬 日本皮膚科学会皮膚科専門医、医学博士。東京慈恵会医科大学医学部卒業、同大附属病院皮膚科非常勤講師